



Composition

Contient 100 g/l de Cyperméthrine en concentré émulsionnable

CYTHRINE 10 EC

Insecticide à large spectre d'action agissant par contact, ingestion et inhalation

Activité biologique

CYTHRINE™ 10 EC est un insecticide pyréthroïde agissant sur le système nerveux de l'insecte par contact, ingestion et inhalation. Il est doté d'une bonne action choc et présente un effet répulsif. **CYTHRINE™ 10 EC** est également utilisé en lutte antiacridienne.

Doses d'application

CYTHRINE™ 10 EC s'applique sur les fruits, les légumes, le maïs, la pomme de terre, les cultures industrielles et ornementales.

Culture	Ravageurs	Dose	Délais Avant récolte
Cultures légumières et industrielles	Noctuelles	0.30-0.50 (l/ha)	7 jours
Cultures sous serres	Aleurodes	0.30-0.50 (l/ha)	7 jours
Poiriers	Psylle	0.25 (l/ha)	14 jours
Pommes de terre	Teigne	0.30 (l/ha)	7 jours

Persistance d'action: 7 à 14 jours

Emploi autorisé pendant la floraison ou au cours des périodes d'exsudation du miellat à condition de respecter les doses, modes d'emploi et précautions fixés dans l'autorisation de vente.

COMPATIBILITE

Compatible avec la plupart des fongicides et insecticides mais incompatibles avec les préparations alcalines. En cas de mélange avec un autre produit, réaliser un test préalable.

Notre société décline toute responsabilité sur les conséquences résultant de mélange de différents produits.

Distribué en Algérie par: SARL AGRICOM INTERNATIONAL

 **AGRICOM**
International

Oued el Karma Gué de Constantine, Alger

Tél / Fax: 023 53 82 03 / 023 53 82 04

Mob: 0661 90 10 48

Email: sarlagricom@yahoo.fr

Web: www.agricominternational.dz